

بطاقة السجل الخاصة بالمساءلة والعمل

المقاييس

المعايير والرقابة المالية

وضع حظر العلاج الأحادي المرتكز إلى أرتيميسينين لقم	
إدارة الحالة في المجتمع المحلي (التهاب الزنوبي)	
إدارة الحالة في المجتمع المحلي (الملاريا)	
تصنيف البنك الدولي الخاص بإدارة القطاع العام والمؤسسات لعام 2013 (سياسة الدولة والتعليم المؤسسي لكثافة د)	2.2

المتبع المعمول، التنفيذ وتأثير الملاريا

التصور الموضوع لعام 2014 بشأن تمويل التأميمات المضادة للتحشرات طويلة الأمد (% من الحاجة)	100
التصور الموضوع لعام 2014 بشأن قيام القطاع العام بتمويل الخيارات التشخيص السريع (% من الحاجة)	96
التصور الموضوع لعام 2014 بشأن قيام القطاع العام بتمويل العلاج الجامع المستند إلى مادة الأرتيميسينين (% من الحاجة)	100
التغطية التشخيصية للتأميمات المبيدة للتحشرات طويلة الأمد/ مضخات الرش الترسيب المتكرر داخل المباني (% من عدد السكان المعرضين للخطر)	63
على الطريق لتقليل حالات الإصابة بالملاريا بنسبة تتجاوز 75% بحلول عام 2015 (مقارنة بعام 2000)	


مؤشرات المتداولين لصحة الأم والطفل

تغطية عام 2013 الخاصة بمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل (نسبة المرضى من حاملي فيروس نقص المناعة البشرية الذين يتلقون الدواء المضاد للفيروس)	92
نسبة الولايات التي تتم بمساعدة قبلات التوليد من أصحاب المهارات	23
الرضاعة الطبيعية الحصرية (نسبة الأطفال من ذوي الأعمار دون 6 أشهر)	41
تغطية فيتامين أ 2012 (جرعات)	83
ثلاث جرعات من الفتح الثلاثي الدفتيريا/السعال الديكي/التكزاز للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12-23 شهر (2012)	92
تغطية في مرحلة ما بعد الوضع (خلال 48 ساعة)	

مفتاح الرسم البياني



تم تحقيق الهدف أو وضعه على المسار الصحيح  
تم تسجيل تقدم لكن مطلوب بذل المزيد من الجهد  
ليس على المسار الصحيح  
لا يوجد بيانات/لا ينطبق



يتراوح معدل انتقال الملاريا في السودان من المنخفض إلى المتوسط وأحياناً يصل إلى حد الوباء. في عام 2012، وصل عدد حالات الإصابة السنوية بمرض الملاريا المبلغ عنها إلى 964,698 حالة، مع 618 حالة وفاة.

### التقدم

حققت السودان تقدماً مضطرباً على صعيد زيادة التدخلات المعنية بمكافحة الملاريا حيث نجح على وجه خاص في اجتذاب المصادر لهذا الغرض من خلال الصندوق الدولي. ولقد تبنت الدولة أيضاً سياسة إدارة الحالات في المجتمع المحلي (Community Case Management) لعلاج الملاريا وحظر سبل العلاج الأحادي الشفهي المرتكز إلى مادة الأرتيميسينين. ولقد تحصلت السودان على أغلبية الموارد المطلوبة لاستدامة التغطية الشاملة لعدد من التدخلات المتعلقة بالملاريا في 2014. كما حققت السودان تغطية واسعة لمؤثر صحة الأم والوليد والطفل والتطعيم ضد الخناق والسعال الديكي والكزاز والتطعيم بفيتامين A.

### التأثير

أظهرت التقارير الصادرة عن وزارة الصحة انخفاضاً في حالات الوفيات المسجلة الناتجة عن الملاريا مقارنة بمعدلاتها في عام 2000. هذا ولقد تم تسجيل ذلك التقدم على صعيد خفض عدد الحالات على المستوى دون القومي نظراً لتركيز التدخلات المعنية. وقد وصل عدد حالات الإصابة بالملاريا في عام 2012 إلى 964,698 حالة، مع 618 حالة وفاة.

### التحديات الأساسية

- التأخير في توزيع الأموال .

### الإجراءات الأساسية الموصى به سابقاً

الهدف	الإجراء	الجدول الزمني المقترح لاستكمال العمل	التقدم	الملاحظات- الأنشطة/ الإنجازات الأساسية- نذ التقرير الربع سنوي الأخير
معالجة مسألة التمويل	التأكيد على تقديم مذكرة مفهوم نموذج التمويل الجديد بحلول الربع الثالث من عام 2014 وضمان تعيين المصادر اللازمة لمكافحة الملاريا على مستوى يكفي للحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال السنوات السابقة	الربع الثالث من عام 2014		قدمت السودان مذكرة مفهوم نموذج التمويل الجديد في شهر أغسطس.

### مفتاح الرسم البيان

إنجاز العمل	خضراء
تم إحراز بعض التقدم	أصفر
لم يتم إحراز تقدم	أحمر
المخرجاً لم يحن ميعادها بعد	رمادي