


بطاقة السجل الخاصة بالمساعدة والعمل



المقاييس

السياسات والرقابة المالية

وضع حظر العلاج الأحادي المرتكز إلى أرتيميسينين الفم	
إدارة الحالة في المجتمع المحلي (الالتهاب الرئوي) (2014)	
إدارة الحالة في المجتمع المحلي (الملاريا) (2014)	
تصنيف البنك الدولي الخاص بإدارة القطاع العام والمؤسسات لعام 2013 (سياسة الدولة والتقييم المؤسسي الكتللة د)	


النتائج المموّلة، التنفيذ وتأثير الملاريا

التصور الموضوع لعام 2014 بشأن تمويل اللاموسيات المضادة للحشرات طويلة الأمد (% من الحاجة)	100
التصور الموضوع لعام 2014 بشأن قيام القطاع العام بتمويل اختبارات التشخيص السريع (% من الحاجة)	100
التصور الموضوع لعام 2014 بشأن قيام القطاع العام بتمويل العلاج لجامع المستد إلى مادة الأرتيميسينين (% من الحاجة)	100
التغطية التشغيلية للناموسيات المبيدة للحشرات طويلة الأمد/ مضخات الرش الترسبي المتكرر داخل المباني (% من عدد السكان المعرضين للخطر)	28
على الطريق لتقليل حالات الإصابة بالملاريا بنسبة تتجاوز 75% بحلول عام 2015 (مقارنة بعام 2000)	

مؤشرات المتداولين لصحة الأم والطفل

تغطية عام 2013 الخاصة بمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل (نسبة المرضى من حاملي فيروس نقص المناعة البشرية الذين يتلقون الدواء المضاد للفيروس)	3
نسبة الولادات التي تتم بمساعدة قبالات التوليد من أصحاب المهارات	33
الرضاعة الطبيعية الخالصة (نسبة الأطفال من ذوي الأعمار دون 6 أشهر)	9
تغطية فيتامين أ 2012 (جرعات)	
ثلاث جرعات من الفاح الثلاثي الفلوريدي/السعل النيكبي/الكزاز للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12-23 شهر (2012)	42
التغطية في مرحلة ما بعد الوضع (خلال 48 ساعة)	

مفتاح الرسم البياني



تم تحقيق الهدف أو وضعه على المسار الصحيح
تم تسجيل تقدم لكن مطلوب بذل المزيد من الجهد
ليس على المسار الصحيح
لا يوجد بيانات/لا ينطبق

يتراوح انتقال مرض الملاريا من كونه غير مستقر ووبائي في بونتلاندا وصومالي لاند إلى كونه متوسط في وسط الصومال ومرتفع في الجنوب. في عام 2013، وصل عدد حالات الإصابة السنوية بمرض الملاريا المبلغ عنها إلى 36,923 حالة.

التقدم

حققت الصومال تقدماً مضطرباً على صعيد زيادة التدخلات المعنية بمكافحة الملاريا حيث نجحت على وجه خاص في اجتذاب المصادر عبر الصندوق الدولي. ولقد أمنت الدولة تمويل كافي لشراء ما يلزم من الناموسيات المبيدة للحشرات طويلة الأمد (LLIN) والعلاج الثنائي المرتكز إلى مادة الأرتيميسينين (ACT) والاختبارات التشخيصية السريعة (RDT) خلال عام 2014. كما تبنت الصومال سياسة إدارة الحالات في المجتمع المحلي (Community Case Management).

التأثير

في عام 2013، وصل عدد حالات الإصابة السنوية بمرض الملاريا المبلغ عنها إلى 36,928 حالة.

التحدي الرئيسي

- افتقار المصادر الجديدة المخصصة للملاريا بموجب نموذج التمويل الجديد للصندوق الدولي يقوض من قدرة الدولة في الحفاظ على المكتسبات الحيوية التي حققتها في حربها على الملاريا.

الإجراءات الأساسية الموصى به سابقاً

الهدف	عنصر الإجراء	الجدول الزمني المقترح لاستكمال العمل	التقدم	الملاحظات- الأنشطة/ الإنجازات الأساسية منذ التقرير الربع سنوي الأخير
معالجة مسألة التمويل	تقييم الآثار المترتبة على قصور التمويل الجديد عبر الصندوق الدولي والعمل على تعيين المصادر اللازمة لمكافحة الملاريا على مستوى يكفي للحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال السنوات السابقة من خلال إعادة تحديد الأولويات وإعادة وضع البرامج.	الربع الثالث من عام 2014		قامت الدولة بتقديم عرض لمرحلة ثانية للصندوق الدولي ولكن طُلب منها تقديم مذكرة مفهوم نموذج التمويل الجديد في نوفمبر 2014.

مفتاح الرسم البياني

إنجاز العمل	
تم إحراز بعض التقدم	
لم يتم إحراز تقدم	
المخرجات لم يحن ميعادها بعد	