

بطاقة السجل الخاصة بالمساعدة والعمل



المقاييس

السياسات والرقابة المالية

وضع حظر العلاج الأحادي المرتكز إلى أرتيميسينين لهم	
إدارة الحالة في المجتمع المحلي (الانتهاج الربوي)(2014)	
إدارة الحالة في المجتمع المحلي (الملاريا)(2014)	
تصنيف البنك الدولي الخاص بإدارة القطاع العام والمؤسسات لعام 2013 (سياسة الدولة والتقييم المؤسسي لكثافة د)	2.2

السلع الممولة، التنفيذ وتكثير الملاريا


التصور الموضوع لعام 2014 بشأن تمويل التأموسيات المضادة للتحشرات طويئة الأمد (% من الحاجة)	100
التصور الموضوع لعام 2014 بشأن قيام القطاع العام بتمويل اختبارات التشخيص السريع (% من الحاجة)	96
التصور الموضوع لعام 2014 بشأن قيام القطاع العام بتمويل العلاج الجامع المستند إلى مادة الأرتيميسينين (% من الحاجة)	100
التغطية التشغيلية للتأموسيات المبيدة للتحشرات طويئة الأمد/ مضخات الرش الترسيبي المتكرر داخل المباني (% من عدد السكان المعرضين للخطر)	80
على الطريق لتقليل حالات الإصابة بالملاريا بنسبة تتجاوز 75% بحلول عام 2015 (مقارنة بعام 2000)	

مؤشرات المتداولين لصحة الأم والطفل

تغطية عام 2013 الخاصة بمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل (نسبة المرضي من حاملي فيروس نقص المناعة البشرية الذين يتلقون الدواء المضاد للفيروس)	3
نسبة الولادات التي تتم بمساعدة قهلات التوليد من أصحاب المهارات	23
الرضاعة الطبيعية الخالصة (نسبة الأطفال من ذوي الأعمار دون 6 أشهر)	41
تغطية فيتامين أ 2012(جرعان)	83
ثلاث جرعات من الفلاح الثلاثي التقديرية/السعال الدوي/الكزاز للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12-23 شهر (2012)	92
تغطية في مرحلة ما بعد الوضع (خلال 48 ساعة)	

يتراوح معدل انتقال الملاريا في السودان من المنخفض إلى المتوسط وأحياناً يصل إلى حد الوباء. في عام 2013، وصل عدد حالات الإصابة السنوية بمرض الملاريا المبلغ عنها إلى 989,946 حالة، مع 685 حالة وفاة.

مفتاح الرسم البياني



تم تحقيق الهدف أو وضعه على المسار الصحيح
تم تسجيل تقدم لكن مطلوب بذل المزيد من الجهد
ليس على المسار الصحيح
لا يوجد بيانات/لا ينطبق

التقدم

حققت السودان تقدماً مضطرباً على صعيد زيادة التدخلات المعنية بمكافحة الملاريا حيث نجح على وجه خاص في اجتذاب المصادر لهذا الغرض من خلال الصندوق الدولي. ولقد تبنت الدولة أيضاً سياسة إدارة الحالات في المجتمع المحلي (Community Case Management) لعلاج الملاريا وحظرت سبل العلاج الأحادي الشفهي المرتكز إلى مادة الأرتيميسينين. ولقد تحصلت السودان على أغلبية الموارد المطلوبة لاستدامة التغطية الشاملة لعدد من التدخلات المتعلقة بالملاريا في 2014. كما حققت السودان تغطية واسعة لمؤشر صحة الأم والوليد والطفل والتطعيم ضد الخناق والسعال الديكي والكزاز والتطعيم بفيثامين A.

التأثير

أظهرت التقارير الصادرة عن وزارة الصحة انخفاضاً في حالات الوفيات المسجلة الناتجة عن الملاريا مقارنة بمعدلاتها في عام 2000. هذا ولقد تم تسجيل ذلك التقدم على صعيد خفض عدد الحالات على المستوى دون القومي نظراً لتركيز التدخلات المعنية. وقد وصل عدد حالات الإصابة بالملاريا في عام 2013 إلى 989,946 حالة، مع 685 حالة وفاة.

التحديات الأساسية

- التأخير في توزيع الأموال .