


## Carte de Score pour la Redevabilité et l'Action



La transmission du paludisme au Tchad est intense dans le sud du pays. Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 1 402 215 cas de paludisme en 2016 et 1 686 décès.

### Mesures

#### Produits de base : financement et contrôle budgétaire

Prévisions de 2017 visant le financement de MILD (pourcentage du besoin)	86
Prévisions de 2017 visant le financement des TDR par le secteur public (pourcentage du besoin)	51
Prévisions de 2017 visant le financement des CTA par le secteur public (pourcentage du besoin)	47
Notation de la Banque mondiale concernant la gestion du secteur public et les institutions 2016 (CPIA groupe D)	2.7






#### Suivi de la résistance aux insecticides, mise en place et impact

Cours sur les insecticides avec focus sur la résistance des moustiques dans des sites sentinelles représentatifs confirmés depuis 2010	2
Résistance aux insecticides suivie depuis 2015 et données déclarées à l'OMS	
Plan national de surveillance et de gestion de la résistance aux insecticides	
Échelle de mise en oeuvre de la PEC-C (2016)	
Couverture opérationnelle MILD/PID (% population à risque)	100
Changement estimé du taux d'incidence du paludisme (2010-2016)	

#### Indicateurs témoins de la santé maternelle et infantile et des MTN

Couverture du traitement de masse contre les maladies tropicales négligées (indice MTN, %) (2016)	10
Estimation du pourcentage de la population atteinte du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2016)	39
Estimation du pourcentage d'enfants (0 à 14 ans) atteints du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2016)	13
% des accouchements assistés par un accoucheur ou une accoucheuse compétente	34
Soins postnataux (dans les 48 heures)	15
Allaitement maternel exclusif (% enfants < 6 mois)	1
Couverture Vitamine A 2015(2 doses)	85
Vaccins DTC3 2016 parmi les bébés de 0-11 mois	78

### Légende

	Cible atteinte ou sur la bonne voie
	Progrès mais effort supplémentaire requis
	Pas en bonne voie
	Sans données
	Non applicable

## Paludisme

### Progrès

Le Tchad a élargi la mise en œuvre de la PCCi et s’est procuré suffisamment de MILD pour atteindre la couverture opérationnelle universelle.

### Impact

Les nombres annuels déclarés s’élèvent à 1 402 215 cas de paludisme en 2016 et 1 686 décès.

### Problème principal

- Faiblesse du système d’information sanitaire.

### Mesures clés recommandées précédemment

Objectif	Mesure	Délai d’accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/ accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
Lutte anti-vectorielle	Étant donné la résistance déclarée des moustiques à deux classes d’insecticides, finaliser de toute urgence et mettre en œuvre le plan national de surveillance et gestion de la résistance aux insecticides.	T1 2017		Le plan de gestion de la résistance aux insecticides sera élaboré dès que les données de l’exercice de surveillance courant auront été analysées. Le PNLP va demander une assistance technique à l’OMS AFRO.
Résoudre la question du financement.	Accélérer la signature de la subvention du FM.	T4 2017		Le pays a finalisé la documentation nécessaire à la signature de la subvention et est en bonne voie de signature avant son expiration.
Lutte anti-vectorielle	Déclarer à l’OMS l’état de la surveillance de la résistance aux insecticides.	T3 2018		Résultat non encore échu.

## SMI et MTN

### Progrès

Le Tchad a amélioré ses mécanismes de suivi et de redevabilité par la mise au point d’une Carte de Score de Santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile.

Les progrès réalisés sur le plan des maladies tropicales négligées (MTN) au Tchad se mesurent au moyen d’un indice composite calculé d’après la couverture de la chimiothérapie préventive atteinte pour la filariose lymphatique, l’onchocercose, la schistosomiase, les géohelminthiases et le trachome. La couverture de la chimiothérapie préventive au Tchad est de 51 % pour la filariose lymphatique, 68 % pour l’onchocercose et 38 % pour le trachome, mais elle est faible pour la schistosomiase et les géohelminthiases (0 % et 6 %, respectivement). Globalement, l’indice de couverture de la chimiothérapie préventive des MTN au Tchad en 2016 est de 10, en hausse par rapport à la valeur d’indice 2015 (1).

## Mesures clés recommandées précédemment





Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré	Progrès	Commentaires - activités/ accomplissements clés depuis le dernier rapport trimestriel
SMI <sup>1</sup> : Optimiser la qualité des soins.	Accélérer la couverture de la thérapie antirétrovirale dans la population globale et chez les enfants de moins de 14 ans.	T2 2018		Résultat non encore échu.

Le Tchad a répondu favorablement aux mesures de SMI recommandées pour résoudre le problème de la faible couverture de l'assistance à l'accouchement par un personnel de santé qualifié, en hausse depuis lors. Le pays a aussi répondu favorablement aux mesures recommandées concernant l'allaitement maternel exclusif, l'accélération de la couverture des thérapies antirétrovirales et le manque de données relatives aux soins postnataux. Il continue à suivre les progrès des interventions mises en œuvre.

## Nouvelles mesures clés recommandées

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré
SMI <sup>2</sup> : Optimiser la qualité des soins.	Résoudre la couverture en baisse de la vitamine A	T4 2018
MTN	Étant donné la bonne couverture atteinte dans la chimiothérapie préventive (CP) de l'onchocercose et de la filariose lymphatique, mettre en œuvre la CP contre la schistosomiase et chercher à accroître la couverture pour les géohelminthiases et le trachome	T4 2018

## Légende

	Mesure accomplie
	Progrès
	Pas de progrès
	Résultat non encore échu

<sup>1</sup> Mesures de la SMI, mesures recommandées et réponse suivies par OMS MCA.

<sup>2</sup> Mesures de la SMI, mesures recommandées et réponse suivies par OMS MCA.