

















Carte de Score pour la Redevabilité et l'Action







Mesures

Politique et contrôle financiers	
Situation de l'interdiction des monothérapies à base d'artémisinine par voie orale	
Prise en charge des cas au niveau communautaire (pneumonie)(2015)	
Prise en charge des cas au niveau communautaire (paludisme)(2015)	
Notation de la Banque mondiale concernant la gestion du secteur public et les institutions 2013 (CPIA groupe D)	 2.4
Intrants financés, mise en œuvre et impact sur le paludisme	
Prévisions de 2015 visant le financement des MILD par le secteur public (pourcentage du besoin)	 82
Prévisions de 2015 visant le financement des TDR par le secteur public (pourcentage du besoin)	 58
Prévisions de 2015 visant le financement des CTA par le secteur public (pourcentage du besoin)	 72
Couverture opérationnelle MILD/PID (% population à risque)	 93
En bonne voie en 2013 de réduire l'incidence du paludisme de >75 % d'ici 2015 (par rapport à 2000)	
Indicateurs traceur de santé maternelle et infantile	
Couverture PTME 2013 (% femmes enceintes VIH+ recevant des ARV)	 33
% des accouchements assistés par un accoucheur ou une accoucheuse compétente	 80
Allaitement maternel exclusif (% enfants < 6 mois)	 48
Couverture Vitamine A 2012(2 doses)	 84
Vaccins DTC3 2012 parmi les bébés de 12-23 mois	 72
Soins postnataux (dans les 48 heures)	 44

La population entière de la République Démocratique du Congo court un risque élevé de contraction du paludisme. La transmission est intense toute l'année, avec quelques variations saisonnières. Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 11 363 817 cas de paludisme en 2013 et 30 918 décès.

Légende

	Cible atteinte ou sur la bonne voie
	Progrès mais efforts supplémentaires requis
	Pas sur la bonne voie
	Sans données / Sans objet

Progrès

La République Démocratique du Congo a interdit les monothérapies à base d'artémisinine par voie orale et instauré des politiques de prise en charge communautaire des cas de paludisme et de pneumonie. Le pays s'est assuré un approvisionnement suffisant en MILD pour atteindre un haut niveau de couverture. Le pays a atteint une bonne couverture au niveau des interventions de SMI témoins de l'assistance qualifiée à l'accouchement et de la vitamine A.

Impact

Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 11 363 817 cas de paludisme en 2013 et 30 918 décès.

Problème principal

- Les ressources sont insuffisantes au maintien de la couverture universelle et au déploiement continu des interventions antipaludiques essentielles.

Mesures recommandées

La République Démocratique du Congo a répondu favorablement aux mesures recommandées pour résoudre le problème de la faible couverture PTME et continue à suivre les progrès de l'intervention mise en œuvre.