

التقرير ربع السنوي لاتحاد القادة الأفارقة لمكافحة الملاريا (ALMA) في الصومال الربع الرابع من عام 2018

بطاقة السجل الخاصة بالمساءلة والعمل

المقاييس

لرقابة المالية	السلع الممولة وال
توقع تمويل شبكات مبيدات حشرية طويلة الأمد/الرش المتبقي داخل المباني 2018 (% من الحاجة)	21
التصور الموضوع لعام 2018 بشأن فيلم القطاع العلم بتمويل اختبارات التشخيص السريع (٪ من الحاجة)	100
التصور الموضوع لعام 2018 بشنن فيام القطاع العام بتمويل العلاج الجامع المستند إلى مادة الأرتبيسينين (٪ من الحاجة)	100
تصنيف البنك الدولي الخاص بدارة القطاع العام والمؤسسات لعام 2017 (سياسة الدولة والتقييم المؤسسي الكتلة د)	


مراقبة مقاومة الحشرات والتتفيذ والأثر

أصناف الحشرات المقاومة للبعوض في مواقع الرصد التمثيلية المؤكدة منذ عام 2010	3
مقاومة المبيدات الحشرية التي تمت مرافيتها منذ العام 2015 والبيانات التي تم الإبلاغ عنها إلى منظمة الصحة العالمية	
الخطة الوطنية لإدارة ومراقبة مقاومة المبيدات الحشرية	
نطاق تنفيذ خطة إدارة ومراقبة مقاومة المبيدات الحشرية (2017)	
التغطية التشغيلية للداموسيات المبيدة للحشرات طويلة الأمد/ مضحات الرش الترسبي المتكرر داخل المباني (% من عدد السكان المعرضين للخطر)	31
تغير في تقييم الإصابات بالملاريا (2010-2017)	
تغير في تقيم معدلات الوفيات بالملاريا (2010-2017)	

مؤشرات التتبع لصحة الأم والطفل والأمراض المدارية المهملة (NTDs)

النسبة المقرة ٪ من إجمالي السكان المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والنين بحصلون على العلاج المضاد للفيروسات (2017)	28
النسبة المقترة / من الأطفال (14-0سنة) المصابين بغيروس نقص المناعة البشرية والذين يحصلون على العلاج المضاد للفيروسات (2017)	10
نسبة الولادات التي نتم بمساعدة قابلات التوليد من أصحاب المهارات	9
الطلبة في مرحلة ما بعد الوضع (خلال 48 ساعة)	
الرضاعة الطبيعية الخلصة (نسبة الأطفال من ذوي الأعسار دون 6 أشهر)	5
تعطية فيتفين أ 2016(جرعتان)	9
ثاث جرعات من اللقاح الثلاثي المفتيريا/السعال الديكي/الكراز للأطفال الذين تتراوح أعدرهم بين 10-11 شهر (2017)	42

▲ تغطية شاملة لعلاج الأمراض المدارية المهملة (مؤشر % (2017) (NTD)



مفتاح الرسم تم تحقيق الهدف أو جاري العمل على المسار جاري التقدم ولكن بحاجة للمزيد من الجهد ليس على المسار لا توجد بيانات



يتراوح انتقال مرض الملاريا من كونه غير مستقر ووبائي في بونتلاند وصومالي لاند إلى كونه متوسط في وسط الصومال ومرتفع في الجنوب. في عام 2017، وصل عدد حالات الإصابة السنوية بمرض الملاريا المبلّغ عنها إلى 37,156 حالة، و20 حالة وفاة.



التقرير ربع السنوي لاتحاد القادة الأفارقة لمكافحة الملاريا (ALMA) في الصومال الربع الرابع من عام 2018

الملاريا

التقدم

وفرت الصومال الموارد الكافية لتغطية توريد وتوزيع الناموسيات المبيدة للحشرات طويلة الأمد (LLIN) والعلاج الثنائي المرتكز إلى مادة الأرتيميسينين (ART) والاختبارات التشخيصية السريعة (RDT) خلال عام 2018.

التحديات الرئيسية:

ضعف الأنظمة الصحية وضعف عدد الشركاء نسبياً مما يحد من التدخلات الرئيسية لمكافحة الملاريا.

التأثير

بلغ عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها لحالات الإصابة بالملاريا في العام 2017 إلى 37,156 حالة مع 20 حالة وفاة.

الإجراءات الرئيسية السابقة الموصى بها

التعليقات - الأنشطة/الإنجازات الرئيسية منذ آخر تقرير ربع سنوي	التقدم	الإطار الزمني المقترح للإتمام	عنصر العمل	الأهداف
ستنتهي الصومال من تنفيذ خطة إدارة ومراقبة مقاومة المبيدات الحشرية في الربع الرابع من العام 2018. وقد وضعت الدولة أيضاً خطة لإجراء اختبارات القابلية في ثلاثة مواقع للرصد		الربع الأول للعام 2017	إبلاغ منظمة الصحة العالمية بشأن حالة رصد مقاومة المبيدات الحشرية وإعداد وتنفيذ الخطة الوطنية لرصد ومقاومة المبيدات الحشرية وإدارتها.	مكافحة النواقل
في الربع الأول من العام 2019.				

الإجراءات الرئيسية الجديدة الموصى بها

الإطار الزمني المقترح للإتمام	عنصر العمل	الأهداف
المربع الرابع من المعام 2019	التحقيق في وتناول أسباب زيادة تقدير منظمة الصحة العالمية لحالات الإصابة ومعدل الوفيات بسبب الملاريا بين عامي 2010 و 2017.	التأثير

مؤشر صحة الأم والوليد والطفل والأمراض الاستوائية المهملة

يُقاس التقدم في معالجة الأمراض الاستوائية المهملة (NTDs) في الصومال باستخدام المؤشر المُركب الذي يتم حسابه من تغطية العلاج الكيميائي الوقائية التي تم تحقيقها للبلهارسيا، والديدان المنقولة من خلال التربة. تغطية العلاج الكيميائي الوقائي في الصومال جيدة لكلاً من البلهارسيا (51%) وبالنسبة للديدان المنقولة من خلال التربة (31%). بصفة عامة، فإن مؤشر تغطية العلاج الكيميائي الوقائي للأمراض الاستوائية المهملة في عام 2017 هو 40، والذي يمثل زيادة كبيرة مقارنة بقيمة المؤشر عام 2016 وهي (0).

الإجراءات السابقة الموصى بها

	الإجراء السابعة الموصى بها			
التعليقات - الأنشطة/الإنجازات الرنيسية منذ آخر تقرير ربع سنوي	التقدم	الإطار الزمني المقترح للإتمام	عنصر العمل	الأهداف
تطلق الصومال حالياً وتنفذ سياسة "الاختبار والعلاج" والخيار +8 لتقديم خدمة PMTCT. يتمم ذلك بناء القدرات، والتدريب، والإرشاد. فيما تعمل الدولة على توسيع نطاق إتاحة خدمات العلاج الثنائي المرتكز على مادة والأطفال. ويتم تطوير الإرشادات المعملية والمساعدات الوظيفية لدعم العلاج الثنائي المرتكز على مادة الأرتيميسين (ART). فيما يتم توسيع نطاق التدريبات لتعزيز تكامل العلاج الثنائي المرتكز على مادة الأرتيميسين (ART) لدى البالغين والأطفال ويتم الرتيميسين (ART) باستخدام موارد توريد العلاج الثنائي المرتكز على مادة الأرتيميسين (ART) باستخدام موارد الصندوق الدولي. تزايدت التغطية بمقدار 2% لدى الأطفال و 5% لدى إجمالي السكان.		الربع الأول من العام 2017	a) العمل على تسريع تغطية والعلاج الثنائي المرتكز إلى مادة الأرتيميسينين (ART) لدى إجمالي السكان ولدى الأطفال بعمر أقل من 14 عاماً.	مؤشر صحة الأم والوليد والطفل (MNCH): تعزيز جودة الرعاية
لم يحن موعد تسليم النتائج بعد لم يحن موعد تسليم النتائج بعد		الربع الرابع من العام 2018 الربع الثاني من العام 2019	 التحقيق في وتناول أسباب الانخفاض في قابلات الولادة المهرة. التحقيق في وتناول أسباب الإشارة إلى الانخفاض في تغطية فيتامين أ. 	

استجابت الصومال بإيجابية تجاه الإجراءات الموصى بها بشأن الأمراض الاستوائية المهملة NTD والتي تتناول انخفاض تغطية العلاج الكيميائي الوقائي للأمراض الاستوائية المهملة، وتستمر في متابعة التقدم حيث تم تنفيذ هذه الإجراءات. فيما استجابت الصومال بإيجابية تجاه الإجراءات الموصى بها من مؤشر صحة الأم والوليد والطفل والتي تتناول انخفاض التغطية وضعف البيانات لعدد من التدخلات الرئيسية بما يشمل قابلات الولادة المهرة، والرضاعة الحصرية، ورعاية الأمهات بعد الولادة، والاستمرار في متابعة تقدم هذه الإجراءات أثناء تنفيذها.



¹ مقابيس مؤشر صحة الأم والوليد والطفل (MNCH) ، الإجراءات الموصى بها ومتابعة الاستجابة من خلال وحدة الأمومة، والطفل والمراهقين (MCA) في منظمة الصحة العالمية (WHO).