


Carte de Score pour la Redevabilité et l'Action



La transmission du paludisme est plus intense dans le sud du Mali. Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 2 097 797 cas de paludisme en 2017 et 1 050 décès.

Mesures

Produits de base : financement et contrôle budgétaire	
Prévisions de 2019 visant le financement de MILD (pourcentage du besoin)	81
Prévisions de 2019 visant le financement des TDR par le secteur public (pourcentage du besoin)	100
Prévisions de 2019 visant le financement des CTA par le secteur public (pourcentage du besoin)	100
Notation de la Banque mondiale concernant la gestion du secteur public et les institutions 2017 (CPIA groupe D)	3.0
Suivi de la résistance aux insecticides, mise en place et impact	
Cours sur les insecticides avec focus sur la résistance des moustiques dans des sites sentinelles représentatifs confirmés depuis 2010	4
Résistance aux insecticides suivie depuis 2015 et données déclarées à l'OMS	
Plan national de surveillance et de gestion de la résistance aux insecticides	
Échelle de mise en oeuvre de la PEC-C (2017)	
Couverture opérationnelle MILD/PID (% population à risque)	100
Changement de l'incidence estimée du paludisme (2010–2017)	
Changement des taux de mortalité estimés du paludisme (2010–2017)	
Indicateurs témoins de la santé maternelle et infantile et des MTN	
Couverture du traitement de masse contre les maladies tropicales négligées (indice MTN, %) (2017)	90
Estimation du pourcentage de la population atteinte du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2018)	31
Estimation du pourcentage d'enfants (0 à 14 ans) atteints du VIH et ayant accès à la thérapie antirétrovirale (2018)	18
% des accouchements assistés par un accoucheur ou une accoucheuse compétente	44
Soins postnataux (dans les 48 heures)	58
Allaitement maternel exclusif (% enfants < 6 mois)	31
Couverture Vitamine A 2017 (2 doses)	9
Vaccins DTC3 2017 parmi les bébés de 0-11 mois	66

Légende

	Cible atteinte ou sur la bonne voie
	Progrès mais effort supplémentaire requis
	Pas en bonne voie
	Sans données
	Non applicable

Paludisme

Progrès

Le Mali surveille la résistance aux insecticides depuis 2015 et a déclaré les résultats de sa démarche à l'OMS. Les produits antipaludiques requis pour atteindre et maintenir la couverture universelle en 2019 sont, pour la majorité, financés. Le Mali s'est assuré un approvisionnement suffisant en MILD pour atteindre la couverture universelle. Le pays surveille la résistance aux insecticides depuis 2015 et a déclaré les résultats de sa démarche à l'OMS. Le Mali a amélioré considérablement ses mécanismes de suivi et de redevabilité par la mise au point d'une carte de score pour le contrôle du paludisme. Le pays a réduit son taux estimé de mortalité du paludisme de plus de 40 % depuis 2010. Le pays fait aussi preuve de leadership dans la lutte contre le paludisme par sa participation à l'approche « D'une charge élevée à un fort impact ».

Impact

Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 2 097 797 cas de paludisme en 2017 et 1 050 décès.

Problème principal

- Le pays souffre d'insuffisances de financement, en ce qui concerne notamment la chimioprévention du paludisme saisonnier.

Mesure clé recommandée précédemment

Le pays a répondu favorablement à la mesure recommandée concernant la nécessité de rechercher et résoudre les raisons de la hausse d'incidence estimée du paludisme entre 2017.

SRMNIA et MTN

Progrès

Le Mali a atteint une haute couverture au niveau de l'intervention témoin de la SRMNIA relative à la vitamine A. Il a amélioré considérablement ses mécanismes de suivi et de redevabilité par la mise au point d'une carte de Score de Santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente.

Les progrès réalisés sur le plan des maladies tropicales négligées (MTN) au Mali se mesurent au moyen d'un indice composite calculé d'après la couverture de la chimiothérapie préventive atteinte pour la filariose lymphatique, l'onchocercose, la schistosomiase, les géohelminthiases et le trachome. La couverture de la chimiothérapie préventive au Mali est élevée pour le trachome (100 %), pour la schistosomiase (100 %) et pour les géohelminthiases (100 %). Elle est bonne pour l'onchocercose (78 %) et pour la filariose lymphatique (74%). Globalement, l'indice de couverture de la chimiothérapie préventive des MTN au Mali en 2017 est de 90, en hausse par rapport à la valeur d'indice 2016 (35).

Mesures clés recommandées précédemment

Le pays a répondu favorablement à la mesure de SRMNIA recommandée pour résoudre la faible couverture des thérapies antirétrovirales, avec déclaration récente de légères améliorations, ainsi que le problème de l'assistance à l'accouchement par un personnel de santé qualifié en baisse, et il continue à suivre les progrès des interventions mises en œuvre.

Nouvelle mesure clé recommandée

Objectif	Mesure	Délai d'accomplissement suggéré
SRMNIA ¹ : Optimiser la qualité des soins.	Rechercher et résoudre les raisons de la faible couverture de la vitamine A.	T2 2020

¹Mesures de SRMNIA, mesures recommandées et réponse suivies par l'OMS.